

ムヒの飲むかゆみ・はれ治療薬 ムヒ®AZ錠

販売名: ムヒAZ錠

『ムヒAZ錠』は、「あちこちと全身に広がる」「かゆくて眠れない」「掻きむしらずにはいられない」…そんなかゆみに飲んで効く、ムヒブランドが創る『飲むタイプのかゆみ・はれ治療薬』です。

本品の特長

- 1回1錠で12時間長く効きます。
- 塗り薬では対処しきれない広範囲のかゆみ・はれに効きます。
- 花粉・ハウスダストによる鼻のアレルギー症状にも効きます。
- 便利な個包装タイプです。

こんな症状にお使いください



寝ている間も
かゆい



汗・体温上昇で
かゆい




カサカサで
かゆい



ムヒAZ錠が効く仕組み

ムヒAZ錠は、しっしん・かぶれ、じんましんによる皮膚のかゆみ・はれに優れた効き目を発揮する「アゼラスチン塩酸塩」を配合しています。かゆみ・はれの「発症・拡大・悪化」のメカニズムに3方向から作用し治療します。



ムヒAZ錠は、しっしん・かぶれ等のアレルギー症状、食物等のアレルギーによるじんましんや花粉やハウスダスト等によるアレルギー性鼻炎に使用する薬です。虫さされや化膿等による皮膚のはれ、かゆみや、かぜ等の鼻炎症状には使用しないでください。症状がアレルギーによるものかどうか分からない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)15才未満の小児。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬）。
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
5. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(裏面につづく)

- (4)アトピー性皮膚炎、又はアトピー素因があると診断を受けた人。
 (5)気管支ぜんそくの診断を受けた人。
 (6)発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みず等のかぜ症状がある人。
 (7)皮膚の症状が「じんましん、しっしん・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人。又は、鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
消化器	吐き気・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
循環器	動悸
呼吸器	息苦しさ
泌尿器	頻尿、排尿困難、血尿
肝 臓	全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる
その他	顔面のほてり、鼻乾燥、浮腫、月経異常

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 □のかわき、便秘、下痢、眠気。
4. じんましん、しっしん・かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減がみられるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して服用してください

効能・効果

- じんましん、しっしん・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ
- 花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

用法・用量

次の量を朝食後及び就寝前に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	1錠	2回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)早めに飲みこんでください。長く口中にとどめると苦味を感じることがあります。これは成分自身の苦味によるものです。また、服用後にも苦味を感じることがあります。
- (2)花粉など季節性アレルギー性鼻炎による症状に服用する場合は、花粉飛散期に入って症状が開始したら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3)鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善が見られない場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (4)錠剤の取り出し方
 右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面の膜を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってシートのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



成分とそのはたらき

成人1日量(2錠)中、次の成分を含んでいます。

成分	分量	はたらき
アゼラスチン塩酸塩	2mg	アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、皮膚や鼻のアレルギー症状を緩和します。

添加物として乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限（ケースに西暦年と月を記載）をすぎた製品は服用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から内袋（アルミ袋）開封後はなるべく早く服用してください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
 ☎ 076-472-0911（電話受付時間：月～金（祝日を除く）9：00～17：00）