



しっしん・かゆみ・虫さされに

湿疹、皮膚炎治療薬

販売名：リンデロンVs軟膏

第2類医薬品

リンデロン® Vs 軟膏

SHIONOGI

本剤は皮膚疾患治療薬ですので、化粧下、ひげそり後に使用しないでください。
大量または長期にわたって使用すると、副作用として皮膚が薄くなったり、皮膚の血管が
拡張したりすることがあります。顔面の皮膚は薄いので、特に注意してください。
また、症状が改善した後は漫然と連用しないでください。



よくお読み
ください

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむしなどまたは化膿している患部
(2) 目、目の周囲
3. 顔面には、広範囲に使用しないでください
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむしなどの白せん、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる



効能・効果

しっしん、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん



用法・用量

1日1回～数回 適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないでください。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部分に使うときは、びったりとしたおむつやビニール製の密封性のあるパンツは使用しないでください。
- (6) 化粧下、ひげそり後などに使用しないでください。



お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
●シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)



成分・分量

リンデロンVs軟膏は白色～微黄色の軟膏で、1g中に次の成分を含有しています。

成 分	分量(1g中)	はたらき
ベタメタゾン吉草酸エステル	1.2mg	副腎皮質ホルモンの一つで、炎症をおさえ、かゆみをしずめる

添加物として

流動パラフィン、白色ワセリンを含有しています。



保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



「副作用被害救済制度」について
●(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号

®登録商標